

FACYM 8M

COMPOSICIÓN:

- Cymoxanilo 8% p/p
- Mancozeb 64% p/p

FORMULACIÓN: Polvo mojable (P.M)

MODO DE ACCIÓN: Preventiva, curativa y erradicante.

PRESENTACIÓN: Envases de 1 k y 5 k

GENERALIDADES:

Cymoxanil 8% + Mancozeb 64 %

- Es la asociación en la que se complementan la acción preventiva y de amplio espectro del mancozeb, con la acción específica curativa y erradicante del cymoxanil.
- Sirve para combatir enfermedades causadas por hongos del género Oomicetes, responsables del Mildiú o Peronospora de la Vid y el Tiazón tardío de la papa y el tomate, entre otras.
- Su acción de contacto y penetrante le permite actuar en varias etapas del ciclo de infección del hongo.
- Facym 8M se puede aplicar hasta las 48 horas de ocurrida la infección con buen control de la enfermedad.
- Luego de absorbido el follaje (1 hora), no es lavado por la ocurrencia de lluvias posteriores.

Cultivo	Enfermedad		Dosis Kg / ha	Épocas de aplicación
	Nombre Común	Nombre Científico		
Vid	Mildiú Peronospora	Plasmópara vitícola	1,5 a 2 kg	Agregar en programa periódico o según sistema de alarma.