Fertilizante foliar con magnesio complejado con aminoácidos y suplementado con extractos vegetales

FANAFOL

MAGNESIO 4,2

Análisis: 1 - 0/0 - 0 + 4.2 % Mg + 1.2% AA libres + 6.5% COT

Nutrientes	% p/p
Mg (Mg)	4.2
Nitrógeno total (N)	1.7
Hidrolizado de proteína	21.0
Aminoácidos totales	10.0
Aminoácidos libres	1.2
Carbono orgánico total (COT)	6.5

Fórmula: Cloruro de magnesio, aminoácidos, algas *Ascophyllum nodosum*, conservantes y agua.

Tipo de Formulación:
Concentrado soluble
d=1.2 g/mL pH= 5.5

Contenido Neto:

1L	5L	10 L	20 L

Lote:
Fecha de Fabricación:

Reg. MGAP N° 415 / 021

Este insumo cumple con los requisitos técnicos específicos estipulados por la DGSA en Resolución N° 738

USO EXCLUSIVO AGRÍCOLA

INDUSTRIA URUGUAYA

fanaproqui

⚠ **PRECAUCIÓN: mantener fuera del alcance de los niños, alimentos y animales.**

Versión 5

Dosis y modalidad de uso aconsejados (vía foliar):

Cultivos Extensivos

Cultivo	Momento	Dosis Foliar
Maíz	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Aplicar a partir de 30 días de emergencia y repetir cada 15 días si es necesario.	1 a 2 lt./Há
Trigo, Cebada	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Aplicar durante el crecimiento de las primeras hojas, previo a la emergencia de hoja bandera.	1 a 2 lt./Há
Soja	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Realizar aplicaciones durante el crecimiento vegetativo desde V4.	1 a 2 lt./Há
Girasol	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Aplicar a partir de 30 días de emergencia y repetir cada 15 días si es necesario.	1 a 2 lt./Há
Arroz	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Aplicar a partir de 30 días de emergencia.	2 lt./Há
Caña de azúcar	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Aplicar a partir de 30 días de emergencia.	2 lt./Há

Fanafol Magnesio 4.2 es un fertilizante foliar con agregado de bioestimulante de origen orgánico, que aporta a sus cultivos magnesio en forma complejada para asegurar la penetración y metabolización completa de este nutriente. Este producto es un concentrado especial para prevenir y revertir deficiencias de magnesio en diferentes cultivos. La adición de aminoácidos y de extractos vegetales asegura una asimilación rápida y total a nivel foliar del producto.

Cultivos Hortifrutícolas

Cultivo	Momento	Dosis Foliar
Manzanos y perales	Aplicaciones durante etapa de crecimiento de fruto.	2 lt./Há
Durazneros	Prevención de carencias de magnesio. Tres aplicaciones cada 45 días comenzando previo a la floración.	2 lt./Há
Vid	Prevención de carencias de magnesio. Aplicar previo a la floración y luego de cuajado.	1 a 1,5 lt./Há
Citrus	Prevención de carencias de magnesio. Tres aplicaciones cada 45 días comenzando previo a la floración.	3,5 a 5 lt./Há
Olivo	Prevención de carencias de magnesio. Tres aplicaciones cada 45 días comenzando previo a la floración.	1 a 2 lt./Há
Tomates y morrones	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Realizar aplicaciones durante el crecimiento vegetativo.	1 lt./Há
Papa	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Realizar aplicaciones durante el crecimiento vegetativo activo.	1 lt./Há
Frutilla	Realizar 2 a 4 aplicaciones desde el inicio de crecimiento hasta floración.	1 a 1,5 lt./Há
Hortalizas de hoja	Corrección/prevención de deficiencias de magnesio. Realizar aplicaciones cada 15 días desde el transplante.	1 lt./Há

Los aminoácidos presentes en el producto son activadores vitales del metabolismo vegetal: intensifican y mejoran la producción y el desarrollo vegetativo.

Efectos:

- Prevenir y corregir deficiencias de magnesio en planta

Advertencia:
Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico-agronómico.
Las dosis y frecuencias aconsejadas son indicativas y deben ser aumentadas o disminuidas en relación a las características de la zona y de las exigencias de cada cultivo.

La alta concentración puede provocar la sedimentación, por lo tanto, se recomienda agitar muy bien los recipientes antes de utilizarlos.

Clasificación:
Producto no clasificado como peligroso según SGA.

Consejos de prudencia:

Prevención:

- Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- Usar guantes, lentes, máscara de protección y ropa adecuada para la manipulación.

Intervención

- EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un centro de toxicología o médico si la persona se encuentra mal.
- Enjuagarse la boca.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua/ducharse.
- Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
- En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.

Eliminación
Eliminar el contenido y/o el recipiente de acuerdo a la normativa nacional.

Industria Nacional
Fabricado y registrado por
FANAPROQUI S.A.
Carlos A. López 7150
Montevideo, Uruguay
Tel.: (598) 23200511
ventas@isusa.com.uy
www.fanaproqui.com.uy

AVISO: Se garantiza la composición y concentración de este producto de acuerdo a su etiqueta y registro ante el MGAP, en su envase original y cerrado herméticamente, con su mecanismo de seguridad inalterado. Debido a la imposibilidad del control sobre sus mezclas y su uso correcto, el fabricante no asume ninguna responsabilidad implícita o explícita por daños o perjuicios derivados de su manipulación, almacenamiento, aplicación y uso.

Tecnología Italiana

Respaldo Uruguayo

Versión 5