FACYM 8 M

Fungicida | Polvo Mojable

Composición del producto (%p/p)

Mancozeb	64
Cimoxanilo	8

Número del lote:
Fecha de fabricación:
Tiempo de validez: 2 años

Grupo de resistencia:

Grupo FRAC	**M03/27**	Aptitud FUNGICIDA

CONT. NETO
5 KG

Producto Autorizado por el MGAP - Número de Registro: 2283

INDUSTRIA URUGUAYA
Fabricado y registrado por: FANAPROQUI S.A.
Carlos A. López 7150, Montevideo – Uruguay.
Teléfono: 2320 0511
contacto@fanaproqui.com.uy

RESPALDA:

USO AGRÍCOLA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Mancozeb: Carbamato. Cimoxanilo: Oxima de cianoacetamida.

Clasificación Toxicológica Aguda: **POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPCS/OMS 2009.**

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito.
En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.
En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Antídotos: No tiene antídoto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:
A) Medidas Generales:
- No producir deriva.
- No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagues naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600.
- La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.

B) Peligrosidad del ingrediente activo/formulado
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: **MUY ALTAMENTE TÓXICO**
Medidas de mitigación:
- No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto.
- No aplicar el producto en surcos de erosión, desagües o áreas que favorezcan el escurrimiento a cuerpos de agua adyacentes.
- Respetar áreas de exclusión de aplicación.

A las dosis recomendadas no presenta riesgo en organismos acuáticos.
TOXICIDAD PARA AVES: **MODERADAMENTE TÓXICO**
Medidas de mitigación:
- No aplicar desde madurez fisiológica en adelante. En frutales y hortalizas de fruto no aplicar al partir de la formación completa del fruto (cambios de coloración).

A las dosis recomendadas no presenta riesgo en aves.
TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): **MODERADAMENTE TÓXICO**
Medidas de mitigación:
- Evitar la deriva del producto al suelo.

A las dosis recomendadas no presenta riesgo en lombrices.
C) Destino Ambiental:
Moderadamente persistente en agua-sedimento y altamente soluble en agua.


MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722.
CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES FLEXIBLES (bolsas, vejigas) no lavarlos y llevar por separado de forma de no contaminar los envases limpios. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.



CUIDADO



FACYM 8 M

Fungicida | Polvo Mojable

FACYM 8 M es un fungicida de acción combinada preventivo – curativa y erradicante, capaz de interrumpir el ciclo de desarrollo de ciertos hongos patógenos cuando se aplica en las condiciones que más adelante se detallan, previniendo la re-infección del cultivo. Debido a la combinación de sus componentes, se logran los múltiples modos de acción: a) DE CONTACTO, con los esporos al germinar; b) PENETRANTE, de acción local y dentro de la hora siguiente a la aplicación. Este efecto permite detener el desarrollo del micelio e inhibir la germinación de los esporos, que haya comenzado 3 días antes de la aplicación en Uva; C) ANTIESPORULANTE, reduciendo en alto grado la producción de esporas a partir de las manchas ya establecidas.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis Kg/Há
	Nombre Común	Nombre Científico	
Uva *(Vitis vinífera L.)*	Mildiu o Peronóspora	*Plasmópara Viticola*	1.5 - 2
Cebolla *(Allium cepa L.)*	Peronóspora	*Peronóspora destructor*	2 – 2.5

Momento(s) de aplicación:

Uva: Aplicar en programa periódico o según sistema de alarma. De acuerdo a su tipo de acción puede utilizarse en forma preventiva antes de las lluvias infectantes, o en forma curativa, hasta 48 hs de producida la infección.
Cebolla: Cuando se den las condiciones climáticas predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, con intervalos de 5 a 7 días.
Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde: FACYM 8M debe aplicarse cada 7 a 10 días en la época de crecimiento activo y condiciones climáticas predisponentes para el ataque del hongo, espaciando las aplicaciones en las épocas de menor riesgo. Máximo 10 aplicaciones por temporada.
Modo de preparación y técnica de aplicación: FACYM 8M debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llene el depósito de la pulverizadora con agua hasta el 75% de su capacidad. Luego con el agitador en marcha agregue FACYM 8M, complete con agua y mantenga la agitación durante la aplicación.
Tamaño de gota mínimo a ser utilizado: 250 micrones de DMV. Dicho valor se ajustará hacia arriba según las condiciones climáticas en el momento de aplicar el producto y/o dependiendo del producto aplicar.
Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.
Compatibilidad y fitotoxicidad: FACYM 8M es compatible con fungicidas de uso común, excepto los productos de reacción alcalina. Para conocer la compatibilidad de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a escala en una botella limpia. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.
Tiempos de espera: Uva: 21 días; Cebolla: 7 días.
Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

RESPALDA:

