# FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL ZINC 6**

Versión: 03

Fecha de revisión: 23/12/2021

**Descripción general:** Fertilizante foliar con zinc complejado con aminoácidos y suplementado con algas *Ascophyllum nodosum*

**Nombre comercial:** **FANAFOL ZINC 6**

**Registrado y comercializado por:** FANAPROQUI S.A.




**INDUSTRIA NACIONAL**
Fabricado por FANAPROQUI S.A.

## GENERALIDADES

Fertilizante de uso foliar y apto también para uso en fertirriego.

El Fanafol Zinc 6 es un fertilizante que aporta a sus cultivos zinc en forma complejada para asegurar una penetración y metabolización completa de este nutriente.
La adición de aminoácidos y de extractos vegetales asegura una asimilación rápida y total a nivel foliar del producto.

Este producto es un concentrado especial para prevenir y revertir deficiencias de potasio y azufre en diferentes cultivos

## FÓRMULA

Sulfato de zinc

NORG 8 (Aminoácidos)

ALGHE L35 (Algas *Ascophyllum nodosum*)

Conservantes, agua

# FICHA TÉCNICA

Producto: **FANAFOL ZINC 6**

Versión: 03

Fecha de revisión: 23/12/2021

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| *Estado físico* | Líquido |
| *Tipo de formulación* | Concentrado soluble |
| *Densidad* | 1.234 g/mL |
| *pH* | 4.6 |
| *Color* | Marrón oscuro |
| *Solubilidad* | Total en $H_2O$ |
| *Conductividad eléctrica* | 0.29 mS/cm a 1g/L |

| **COMPOSICIÓN** | **VALOR (% p/p)** |
|---|---|
| (1 – 0 / 0 – 0 ) + 2% S + 6% Zn | |
| *Contenido de zinc (Zn)* | 6 |
| *Contenido de nitrógeno total (N)* | 1 |
| *Contenido de azufre (S)* | 2 |

*Contiene aminoácidos y algas Ascophyllum nodosum*

## PRESENTACIONES

1L, 5L, 10L, 20L

## USOS RECOMENDADOS

Fertilizante foliar formulado para prevenir y/o corregir las deficiencias de zinc en el cultivo. Es un complemento a la fertilización basal.

Se recomienda su aplicación en los cultivos extensivos y en cultivos hortifrutícolas.
Las dosis foliares recomendadas a aplicar van desde 1 L/ha hasta 3 L/ha según cultivo, etapa fenológica y exigencias de la planta.

| Cultivo | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Maíz, sorgo | 1 a 2 lt/ha | Corrección/prevención de deficiencia de Zn, aplicar en estado vegetativo |
| Trigo, cebada | 1 a 1,5 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, aplicar también en Z30 y Z45 |
| Soja | 1 a 1,5 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, aplicar en estado vegetativo |
| Arroz | 2 a 3 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, también en V4 |
| Caña de azúcar | 1 a 1,5 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, luego de emergencia |
| Manzanos, perales | 1 a 2 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, también previo a floración |
| Durazneros | 1 a 2 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, previo a floración |
| Vid | 2 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, previo a floración |
| Citrus | 2 a 3 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, previo a brotación |
| Olivo | 1 a 2 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, usar antes de brotación |
| Tomate y morrón | 1 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, usar 15 dias post-trasplante |
| Papa | 2 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, usar antes de floración |
| Frutilla | 1 a 1.5 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, usar antes de floración |
| Hortalizas de hoja | 1 lt/ha | Corrección/ prevención de deficiencia de Zn, usar c/15 días post-trasplante |

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse en su envase original, herméticamente cerrado, en depósito adecuado, seco, techado y alejado de materiales incompatibles (agentes oxidantes y reductores fuertes, ácidos y bases fuertes).
No dejar a la intemperie, ni exponer a temperaturas elevadas. Resellar o cerrar bien los envases inmediatamente después de su uso.
Mantener lejos del alcance de los niños y personal no autorizado. Almacene lejos de alimentos y bebidas.