FANAVID 85

FUNGICIDA POLVO MOJABLE

fana proqui

INGREDIENTE ACTIVO
Oxicloruro de Cobre 85 % p/p **Expresado en Cobre Metálico 50 % p/p**

GRUPO DE RESISTENCIA		
Grupo FRAC	**M01**	**Aptitud FUNGICIDA**

Producto Autorizado por el MGAP - Número de Registro: 1792

Número de lote:

Fecha de fabricación:

VALIDEZ 2 AÑOS

Cont. Neto
25 kg

País de origen: Uruguay.

Fabricado y registrado por: Fanaproqui S.A.
Carlos A. López 7150, Montevideo - Uruguay
Tel. 23200511, 23209618 / E -Mail: contacto@fanaproqui.com.uy

USO AGRÍCOLA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: inorgánico.
Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS 2019.
Antídotos: Penicilamina
Primeros auxilios: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencia sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices: A) Medidas Generales: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 2900 6136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.
B) Peligrosidad del ingrediente activo/formulado
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: **ALTAMENTE TOXICO**
Medidas de mitigación: No aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto. No aplicar el producto en surcos de erosión, desagües o áreas que favorezcan el escurrimiento a cuerpos de agua adyacentes. No aplicar dentro del área de la zona BUFFER (10 metros para aplicaciones terrestres y 30 metros para aplicaciones aéreas). **A las dosis recomendadas no presenta riesgo en organismos acuáticos.**
TOXICIDAD PARA AVES: **MODERADAMENTE TÓXICO**
A las dosis recomendadas presenta riesgo en aves. Por lo tanto: En frutales y hortalizas de fruto prohibido aplicar a partir de la formación completa del fruto (cambios de coloración).
TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: **PRÁCTICAMENTE NO TOXICO**
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): **MODERADAMENTE TÓXICO**
Medidas de mitigación: Evitar la deriva del producto al suelo.
Realizada a evaluación de riesgo a la dosis recomendada, el riesgo es aceptable.
C) Destino Ambiental: Solubilidad en agua: baja. Coeficiente de partición octanol/agua: bajo. Volatibilidad: baja.
Persistencia en suelo: baja. Movilidad en suelo: baja. Potencial de lixiviación: bajo.
Factor de bioconcentración: bajo.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES FLEXIBLES (bolsas, vejigas) no lavarlos y llevar por separado de forma de no contaminar los envases limpios. Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPO LIMPIO al 2925 4539 o info@campolimpio.org.uy

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar freso, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El deposito debe ser exclusivo para agroquimicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares


RECOMENDACIONES DE USO

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: FANAVID 85 es un fungicida contra enfermedades fungosas que posee una excelente adherencia, lo que le confiere un buen efecto residual. De fácil preparación, provee una suspensión estable.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad		Dosis
	Nombre Común	Nombre Científico	
Limón (Citrus x limón (L.) Osbeck) Mandarina (Citrus reticulata var Clementine) Naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck) Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck)	Sarna	*Sphaceloma fawcetti*	300 a 500 gr./ 100 lts de agua
	Melanosis	*Phomopsis citri*	
	Antracnosis	*Colletotrichum gloesporoides*	
Aplicar en botón floral, caída de pétalos y 20 días después.			
Limón (Citrus x limón (L.) Osbeck) Mandarina (Citrus reticulata var Clementine) Naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck) Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck)	podredumbre parda	*Phytophthora spp.*	
Aplicar próximo a la madurez de la fruta, cubriendo la copa hasta 1 metro de altura.			
Durazno (Prunis persica)	Torque	*Taphrina deformans*	600 gr./ 100 lts de agua
Cuando comienza la apertura de escamas de las yemas (antes de floración). Aplicación otoñal, al tener el árbol el 50% de su follaje en el suelo			
Manzana (Malus domestiva (Suckow) Borkh.) Pera (Pyrus communis L.)	Sarna	*Venturia inaequalis*	300 a 500 gr./ 100 lts de agua
Aplicar de Punta plateada a punta verde (antes de floración)			
Membrillo (Cydonia oblonga P.Miller)	Mancha ocular	*Entomosporium maculatum*	200 a 500gr./ 100 lts de agua
A yema hinchada (antes de la floración) a las dosis más altas. Desde inicio de floración a fruto formado, mínimo 3 aplicaciones; cuando los frutos comienzan a madurar y hasta la cosecha, cada 10 días dosis menores			
Uva (Vitis vinifera L.)	Mildiu	*Plasmopara viticola*	200 a 250 gr./ 100 lts de agua
Comenzar cuando los brotes tienen 10 cm de altura o cuando el Servicio de advertencia lo indique. No aplicar en floración			
Papa (Solanum tuberosum L.)	Tizón temprano	*Alternaria solani*	200 a 300 gr./ 100 lts de agua
	Tizón tardío	*Phytophthora infestans*	
Desde que la planta tiene 10 cm de altura, aplicaciones periódicas cada 7 – 14 días.			
Tomate (Solanum lycopersicum L.)	Tizón temprano	*Alternaria solani*	200 a 300 gr./ 100 lts de agua
	Tizón tardío	*Phytophthora infestans*	
	Viruela	*Septoria lycopersici*	
Desde que la planta tiene 10 cm de altura, aplicaciones periódicas cada 7 – 14 días.			
Cebolla (Allium cepa L.)	Mildiu	*Peronospora destructor*	200 a 300 gr./ 100 lts de agua
Desde que la planta tiene 10 cm de altura, aplicaciones periódicas cada 7 – 10 días.			
Olivo (Olea europaea L.)	Repilo	*Spilocaea oleagina*	250 a 450 gr. / 100 lts. de agua
	Emplomado	*Pseudocercospora cladosporioides*	250 a 450 gr. /100 lts. de agua
Aplicar en primavera para prevenir la infección de las nuevas brotaciones y aplicaciones de otoño. No aplicar en Floración.			
Viveros forestales	Hongo defoliador	*Leptostroma pinastri*	205 gr/ 100 lts de agua
Aplicar en forma preventiva en plantas bien arraigadas cada 10 días, al observar síntomas. Dirigir el tratamiento al cuello de las plantas. No realizar más de 10 aplicaciones.			
Ciruelo, Nectarino, Damasco, Guinda, Cereza	Torque	*Taphrina deformans*	307 a 512g/100L
Iniciar las aplicaciones con un 20% de caída de hojas y repetir 3 a 4 veces según condiciones predisponentes, con intervalo de aplicación de 15 días. Volver a aplicar a inicio de yema hinchada. Máximo 5 aplicaciones por temporada.			
Kaki		*Bateriosis - Venturia spp*	1,2 - 1,5 kg/ha.
Aplicar desde cosecha hasta inicio de floración. Máximo una aplicación por temporada.			
Nogal		*Xanthomonas arborícola*	261 a 311g/100L de agua
Iniciar el primer tratamiento a inicios de brotación, con la dosis maxima. Realizar los tratamientos posteriores con la dosis minima en el inicio de floración en un 15 a 50 % de flor pistilada y al fin de floración. Mojado: 1500 - 2000L de agua/ha. Maximo 5 aplicaciones por temporada.			

Modo de preparación y técnica de aplicación: FANAVID 85 debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llene el deposito de la pulverizadora con agua hasta el 75% de su capacidad. Luego con el agitador en marcha agregue FANAVID 85, complete con agua mantenga la agitación durante la aplicación. Tamaño de gota mínimo a ser utilizado: 250 micrones de DMV. Dicho valor se ajustará hacia arriba según las condiciones climáticas en el momento de aplicar el producto y/o dependiendo del producto a aplicar. **Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Compatibilidad y fitotoxicidad:** No aplicar en manzana y pera una vez cuajada la fruta. Puede causar russeting. No aplicar en durazno en vegetación; puede causar intensa defoliación. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia. Para conocer la compatibilidad de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a escala en una botella limpia. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos, no se corto, se considera que la mezcla es estable**. Tiempos de espera:** Citrus: 0 día; Durazno: no corresponde por su forma de uso; Uva: 14 días; Tomate y cebolla: 7 días; Manzana, Pera y Membrillo: 21 días; Papa: 0 días; Olivo 15 días. Viveros forestales: no corresponde. **Tiempos de reingreso al cultivo:** No ingresar al cultivo hasta que haya secado el depósito del producto aplicado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:** Cuando fungicidas de un modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y/o volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferentes modos de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.



NOCIVO



